



Toepassingsperiode aaltjes

	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	bodemtemperatuur *
Slakken			bestrijding van (naakt)slakken in de bodem									vanaf 5°C	
Schadelijke bodeminsecten			bestrijding van preivlieg, uienvlieg, koolvlieg, wortelvlug en aardrups in de bodem van de moestuin									vanaf 10 °C	
Mieren			aaltjes verjagen mieren en hun nesten (mieren worden niet gedood)										vanaf 10 °C
Trips			in serre	bestrijding van poppen in de bodem larven en adulten door contactwerking op het blad					in serre				vanaf 10°C
Rupsen				rupsen worden bestreden op de plant door contactwerking => rupsen moeten geraakt worden !									vanaf 10 °C
Larven van buxusmot				larven van de buxusmot worden bestreden op de plant door contactwerking => larven moeten geraakt worden !									vanaf 10 °C
Emelten				onderdrukking mogelijk mits dubbele dosering en herhaling van de behandeling				ideale bestrijding 2 weken na vlucht langpootmug					vanaf 10°C
Larven van taxuskever			bestrijding van larven en poppen van taxuskever (snuitkever) in de bodem									vanaf 12°C	
Engerlingen				bestrijding mogelijk	ideale bestrijdingsperiode = 6 weken na de vlucht van de volwassen kever								vanaf 12°C
Larven van coloradokever				bestrijding van de larven van de coloradokever jonge larven zijn het gemakkelijkst te bestrijden									vanaf 12°C

* De start en het einde van de toepassingsperiode is van jaar tot jaar afhankelijk van de bodemtemperatuur.

ECOstyle houdt die voor u in de gaten, de bestelde aaltjes worden uitgeleverd vanaf het moment dat de bodemtemperatuur voldoende hoog is.

Bodemtoepassing : met gieter (de bodem na toepassing minstens 2 weken vochtig houden, maar niet drijfmat)

Bladtoepassing : met sproeier (bladeren na toepassing minstens 2 uur vochtig houden, zonder dat het water er af druipt)

!! Contactwerking : plaaginsecten moeten geraakt worden !!